

## Blefaroplastia Superior y/o inferior

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirá la cantidad de piel a quitar en párpado superior e inferior, así como las bolsas adiposas en párpados superior o inferior que deben ser removidas o recolocadas.

Tipo de Anestesia: Local o anestesia general dependiendo de la extensión de la intervención y de las características de cada

Tiempo de Duración de la Cirugía: 1-2 horas.

Incisiones: en pliegues de párpado superior e inferior.

Uso de apósitos y telas en los párpados : las mantenemos para proteger la herida durante 2 a 7 días.

Alta: suele ser el mismo día, aunque en caso de excesivo edema de tejidos y en determinados pacientes el alta es al día siguiente.

Reintegro laboral: desde 1 a 3 semanas.

Retiro de puntos: 7-10 días

Kinesiterapia postoperatoria: Puede realizar tratamientos de drenaje linfático y masoterapia entre otros desde 1 a 2 días posterior a la cirugía y por 5 a 10 sesiones como mínimo.

Inflamación de los tejidos: hasta 6 meses después de la cirugía, momento que el resultado es ya más definitivo. Cercano al año se suele completar la retracción de los tejidos.

Estado de la cicatriz: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero desde los 9 a 12 meses mejorará su aspecto progresivamente en la mayoría de los pacientes.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1 mes

Complicaciones: sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad. Pérdida de piel en relación a la herida. Retracción cicatricial que requiera cirugía reparadora posterior. Todas estas complicaciones se minimizan en manos de un especialista acreditado y serio.

Duración del resultado: Permanente.