

Implantes faciales

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirá el tipo de defecto o el cambio que usted quiera para definir la forma y el tamaño del implante de pómulos, mentón o mandíbula.

Material del implante: Porex o Silicona

Tipo de Anestesia: Local y sedación o General.

Tiempo de Duración de la Cirugía: 1-2 horas.

Incisiones: en zonas de pliegues o dentro de la boca

Uso de vendaje facial: 7 días.

Alta: el mismo día, es ambulatorio.

Reintegro laboral: desde 2 días hasta 1-2 semanas.

Retiro de puntos: La mayor parte de las suturas no deben ser retiradas.

Uso de la mentonera: Consiste en una faja diseñada par mantener comprimida la zona del mentón o mandíbula. Su uso se recomienda por un mes generalmente.

Kinesiterapia postoperatoria: Puede realizar tratamientos de drenaje linfático y masoterapia entre otros desde 1 a 2 días posterior a la cirugía y por 5 a 10 sesiones como mínimo.

Inflamación de los tejidos: hasta 6 meses después de la cirugía, momento que el resultado es ya más definitivo. Cercano al año se suele completar la retracción de los tejidos.

Estado de la cicatriz: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero desde los 9 a 12 meses mejorará su aspecto progresivamente en la mayoría de los pacientes.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1 mes

Complicaciones: acumulación de líquido o seroma, sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad. Todas estas complicaciones se minimizan en manos de un especialista acreditado y serio.

Duración del resultado: Permanente.