

Lobuloplastía o Cirugía del lóbulo rasgado o hendido.

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirá la necesidad de intervenir uno o dos lóbulos de sus orejas, así como el tipo de incisión necesaria y la cicatriz posterior.

Tipo de Anestesia: Local.

Tiempo de Duración de la Cirugía: 30 minutos.

Incisiones: en el lóbulo auricular.

Uso de telas: durante 2 a 7 días.

Alta: ambulatorio.

Reintegro laboral: mismo día.

Retiro de puntos: 15-21 días

Inflamación de los tejidos: hasta 1 mes después de la cirugía, momento que el resultado es ya más definitivo.

Estado de las pequeñas cicatrices: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero entre 9 a 12 meses será de excelente calidad.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1 mes

Complicaciones: sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad. Todas estas complicaciones se minimizan en manos de un especialista acreditado y serio.

Duración del resultado: Permanente, salvo que vuelva a utilizar aros o expansiones excesivas en peso y tamaño.