

Otoplastia

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirá las técnicas necesaria para que su oreja en asa o alada tenga la forma normal, así mismo la necesidad de disminuir el tamaño de su oreja o de su lóbulo.

Tipo de Anestesia: Local en adultos, general en niños.

Tiempo de Duración de la Cirugía: 2horas.

Incisiones: en la zona posterior de la oreja, no son visibles. Solo son visibles cuando se debe agrandar o achicar una oreja, cirugía algo diferente a la habitual.

Alta: ambulatorio, es decir el mismo día.

Reintegro laboral: desde 1 a 3 semanas.

Retiro de puntos: 15 días

Uso cintillo protector: 15 días día y noche, luego 15 días solo de noche.

Inflamación de los tejidos: hasta 6 meses después de la cirugía, momento que el resultado es ya más definitivo.

Estado de las cicatrices: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero desde los 9 a 12 meses mejorar significativamente en la mayoría de los pacientes.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1-2 mes

Complicaciones: sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de la forma
Todas estas complicaciones se minimizan en manos de un especialista acreditado y serio.

Duración del resultado: Permanente.